

Near-infrared spectroscopy StO₂ monitoring to assess the therapeutic effect of drotrecogin alfa (activated) on microcirculation in patients with severe sepsis or septic shock

No mostrar en "slideshow"

Masip J, Mesquida J, Luengo C, Gili G, Gomà G, Ferrer R, Teboul JL, Payen D, Artigas A

Annals of Intensive Care 2013, 3:30 (4 September 2013)

Abstract <http://www.annalsofintensivecare.com/content/3/1/30/abstract> [1]

Provisional PDF <http://www.annalsofintensivecare.com/content/pdf/2110-5820-3-30.pdf> [2]

- [SEPSIS](#) [3]
- [Publicaciones](#) [4]

- [SEPSIS](#)
- [Publicaciones](#)

URL del envío:

<http://privada.semicyuc.org/temas/investigacion/grupos-de-trabajo/gt-cuidados-intensivos-cardiologia-cos-y-rcp/sepsis/near-infrare>

Enlaces:

[1] <http://www.annalsofintensivecare.com/content/3/1/30/abstract>

[2] <http://www.annalsofintensivecare.com/content/pdf/2110-5820-3-30.pdf>

[3]

<http://privada.semicyuc.org/temas/investigacion/grupos-de-trabajo/gt-enfermedades-infecciosas-y-sepsis/sepsis>

[4] <http://privada.semicyuc.org/temas/publicaciones>