

Guías TEP Submasivo AHA 2011

No mostrar en "slideshow"

Se publican por la AHA las nuevas Guías del TEP Submasivo. En ellas se define el Tromboembolismo Pulmonar Submasivo por criterios de ausencia de hipotensión arterial, PAS > 90mmHg, junto con disfunción ventricular derecha o necrosis miocárdica definida por elevación de Tn. Se acepta la indicación de Fibrinólisis con Alteplase 100 mg en dos horas, en los casos de TEP Agudo Submasivo con inestabilidad hemodinámica, insuficiencia respiratoria, disfunción ventricular derecha grave o necrosis miocárdica importante.

Además las guías repasan otras opciones de tratamiento como la embolectomía y las indicaciones de colocación del Filtro de Cava.

A su vez se repasa la Trombosis ilio-femoral y la HTP Crónica por Embolia Pulmonar.

[Management of Massive and Submassive Pulmonary Embolism, Iliofemoral Deep](#)

[Vein Thrombosis, and Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension: A](#)

[Scientific Statement From the American Heart Association](#) [1]

- [Guías de Práctica Clínica Cardiovascular](#) [2]
- [Guías de práctica clínica](#) [3]
- [Formación](#) [4]

- [Guías de Práctica Clínica Cardiovascular](#)
- [Guías de práctica clínica](#)
- [Formación](#)

URL del envío:

<http://privada.semicyuc.org/temas/formacion/guias-de-practica-clinica/guias-de-practica-clinica-cardiovascular/guias-tep-submasi>

Enlaces:

[1] <http://circ.ahajournals.org/cgi/reprint/CIR.0b013e318214914fv1?papetoc>

[2] <http://privada.semicyuc.org/temas/formacion/guias-de-practica-clinica/guias-de-practica-clinica-cardiovascular>

[3] <http://privada.semicyuc.org/temas/formacion/guias-de-practica-clinica>

[4] <http://privada.semicyuc.org/temas/formacion>