

# Semicyuc

**LOS PROFESIONALES DEL ENFERMO CRÍTICO**

La ambulancia aumenta la  
posibilidad de sobrevivir tras  
un infarto aunque demore la  
llegada al hospital

**3 de JULIO 2012**

SEGUN DATOS DEL ARIAM

## La ambulancia aumenta la posibilidad de sobrevivir tras un infarto aunque demore la llegada al hospital

Directorio Registro Análisis Retraso Infarto Agudo Miocardio  
Sociedad Española Medicina Intensiva Frutos Nogal Unidad Cuidados Intensivos Asimismo  
José Cuñat

Deja tu comentario

Imprimir Enviar

COMPARTE ESTA NOTICIA

17 46

menear tuenti

+1 0

Gestión anuncios

[clínicas de desintoxicación](#)

Centro Tratamiento Adicciones.

Ultimos avances.

Llama ya  
937918008

[Redcita.com/Centro...](#)



Foto: EUROPA PRESS/061/JAVIER RAMOS

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las personas que llaman a una ambulancia cuando notan los síntomas de padecer un infarto tienen más posibilidades de sobrevivir aunque aumente el tiempo de llegada al centro hospitalario, según los datos del Registro de Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (ARIAM) que

ha analizado a lo largo de 2011 a 1.859 pacientes de 56 hospitales españoles.

Esto se debe a que, a pesar de que el tiempo de demora prehospitalaria ha aumentado en 2011 respecto a 2010 --se sitúa en una media de 163 minutos mientras que el año anterior era de 157 minutos--, los servicios de emergencia cuentan con tratamientos que consiguen paliar y disminuir los infartos. Y es que, la principal causa de este retraso se debe al tiempo que tardan los pacientes en solicitar ayuda médica --una media de 135 minutos--.

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

<http://www.europapress.es/salud/noticia-llamar-ambulancia-infarto-aumenta-posibilidades-sobrevivir-demore-llegada-hospital-20120703130735.html>

# Llamar a una ambulancia por un infarto aumenta las posibilidades de sobrevivir aunque se demore la llegada al hospital

**ep europa press**  
www.europapress.es

Martes, 3 de Julio de 2012



Las personas que llaman a una ambulancia cuando notan los síntomas de padecer un infarto tienen más posibilidades de sobrevivir aunque aumente el tiempo de llegada al centro hospitalario, según los datos del Registro de Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (ARIAM) que ha analizado a lo largo de 2011 a 1.859 pacientes de 56 hospitales españoles.

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

<http://www.paginanoticias.es/n/Salud/74rbrm6a3/Llamar-una-ambulancia-por-un-infarto-aumenta.htm>

## Noticias Transporte Sanitario en Aragón

### El Consejo autoriza 16,6 millones para el servicio de asistencia en traslados de pacientes críticos entre hospitales

ANDALUCÍA.- El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES-061) la contratación del servicio de asistencia en traslados de pacientes críticos en ambulancias de Soporte Vital Avanzado entre hospitales de la comunidad autónoma, por un importe de 16,6 millones de euros. El contrato, común para todas las provincias, estará en vigor entre 2012 y 2014, y también prevé traslados a centros de fuera de Andalucía cuando la gravedad del paciente así lo requiera.

La autorización a EPES-061 permitirá contar con 14 equipos móviles para el traslado interhospitalario de pacientes en estado grave: 11 de Soporte Vital Avanzado Medicalizados y tres de Cuidados Avanzados de Enfermería. Toda la flota de vehículos está equipada con el material electromédico necesario para realizar cuidados intensivos y con las últimas tecnologías de la comunicación lo que permite su geolocalización desde los centros de coordinación de urgencias y emergencias del 061. Cada ambulancia está dotada de enfermero y técnico de emergencias sanitarias.

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

<http://trasportesanitarioenaragon.blogspot.com.es/>



[Portada](#) [Nacional](#) [Internacional](#) [Economía](#) [Deportes](#) [Ocio y Cultura](#) [Sociedad](#) [Ciencia y T](#)

## Llamar a una ambulancia por un infarto aumenta las posibilidades de sobrevivir aunque se demore la llegada al hospital

13:07 (3-07-12) Medio: [Europa press](#) Categoría: [Salud](#)

Las personas que llaman a una ambulancia cuando notan los síntomas de padecer un infarto tienen más posibilidades de sobrevivir aunque aumente el tiempo de llegada al centro hospitalario, según los datos del Registro de Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (ARIAM) que ha analizado a lo largo de 2011 a 1.859 pacientes de 56 hospitales españoles. [Leer noticia...](#)

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

<http://www.glovoz.com/noticias/1910363/llamar-a-una-ambulancia-por-un-infarto-aumenta-las-posibilidades-de-sobrevivir-aunque-se-demore-la-llegada-al-hospital>

# iberoamérica.net / españa

Las noticias que se leen ahora en las redes sociales



[Portada](#) > [España](#) > [Prensa generalista](#) > [es.yahoo.com](#)

ARCHIVO: [3-7-2012](#)  
[IR A LA PORTADA DE HOY](#)

5

## Llamar a una ambulancia por un infarto aumenta las posibilidades de sobrevivir aunque se demore la llegada al hospital - Yahoo! Noticias España

<http://es.noticias.yahoo.com/llamar-ambulancia-infarto-aumenta-posibilidades-sobrevivir-demore-llegada-110809283.html>

## Llamar a una ambulancia por un infarto aumenta las posibilidades de sobrevivir aunque se demore la llegada al hospital

Según datos del ARIAM

 Europa Press – mar, 3 jul 2012

 Correo electrónico  Recomendar  Twittear 4  Share  Imprimir

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Las personas que llaman a una ambulancia cuando notan los síntomas de padecer un infarto tienen más posibilidades de sobrevivir aunque aumente el tiempo de llegada al centro hospitalario, según los datos del Registro de Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (ARIAM) que ha analizado a lo largo de 2011 a 1.859 pacientes de 56 hospitales españoles.

Esto se debe a que, a pesar de que el tiempo de demora prehospitalaria ha aumentado en 2011 respecto a 2010 --se sitúa en una media de 163 minutos mientras que el año anterior era de 157 minutos--, los servicios de emergencia cuentan con tratamientos que consiguen paliar y disminuir los infartos. Y es que, la principal causa de este retraso se debe al tiempo que tardan los pacientes en solicitar ayuda médica --una media de 135 minutos--.

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

<http://es.noticias.yahoo.com/llamar-ambulancia-infarto-aumenta-posibilidades-sobrevivir-demore-llegada-110809283.html>

## 24H Noticias ESPAÑA

### **Llamar a una ambulancia por un infarto aumenta las posibilidades de sobrevivir aunque se demore la llegada al hospital**

Posted on 03 Julio 2012.

Las personas que [llaman](#) a una ambulancia cuando notan los [síntomas](#) de padecer un infarto tienen más posibilidades de sobrevivir aunque aumente el tiempo de llegada al [centro](#) hospitalario, según los datos del Registro de Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (ARIAM) que ha analizado a lo largo de 2011 a 1.859 pacientes de 56 hospitales españoles.

## Llamar a una ambulancia por un infarto aumenta las posibilidades de sobrevivir aunque se demore la llegada al hospital

EUROPA PRESS - MADRID - 03-07-2012



**Las personas que llaman a una ambulancia cuando notan los síntomas de padecer un infarto tienen más posibilidades de sobrevivir aunque aumente el tiempo de llegada al centro hospitalario, según los datos del Registro de Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (ARIAM) que ha analizado a lo largo de 2011 a 1.859 pacientes de 56 hospitales españoles.**

Esto se debe a que, a pesar de que el tiempo de demora prehospitalaria ha aumentado en 2011 respecto a 2010 -se sitúa en una media de 163 minutos mientras que el año anterior era de 157 minutos-, los servicios de emergencia cuentan con tratamientos que consiguen paliar y disminuir los infartos. Y es que, la principal causa de este retraso se debe al tiempo que tardan los pacientes en solicitar ayuda médica -una media de 135 minutos-.

'Cuando un paciente acude por medios propios lo hace sin tener ningún tipo de asistencia pero cuando una persona es transportada por un medio de emergencia aunque tarde un poco más es una



Las personas que llaman a una ambulancia cuando

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

<http://www.laregioninternacional.com/noticia/133893/llamar/ambulancia/infarto/aumenta/posibilidades/sobrevivir/aunque/demore/llegada/hospital/>

ISLAS	CANARIAS	NACIONAL	INTERNACIONAL	ECONOMÍA	SOCIEDAD
La Palma	El Hierro	La Gomera	Tenerife	Gran Canaria	

Martes, julio 3rd, 2012 | Publicado por Canarias

## Llamar a una ambulancia por un infarto aumenta las posibilidades de sobrevivir aunque se demore la llegada al hospital

Las personas que llaman a una ambulancia cuando notan los síntomas de padecer un infarto tienen más posibilidades de sobrevivir aunque aumente el tiempo de llegada al centro hospitalario, según los datos del Registro de Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (ARIAM) que ha analizado a lo largo de 2011 a 1.859 pacientes de 56 hospitales españoles.

Esto se debe a que, a pesar de que el tiempo de demora prehospitalaria ha aumentado en 2011 respecto a 2010 –se sitúa en una media de 163 minutos mientras que el año anterior era de 157 minutos–, los servicios de emergencia cuentan con tratamientos que consiguen paliar y disminuir los infartos. Y es que, la principal causa de este retraso se debe al tiempo que tardan los pacientes en solicitar ayuda médica –una media de 135 minutos–.

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

<http://www.canariasactual.com/2012/07/03/llamar-a-una-ambulancia-por-un-infarto-aumenta-las-posibilidades-de-sobrevivir-aunque-se-demore-la-llegada-al-hospital/>

## Llamar a una ambulancia por un infarto aumenta las posibilidades de sobrevivir aunque se demore la llegada al hospital

Imprimir Twitter 0 Me gusta 0

**Sociedad** - 03-07-2012 13:00:00

- Las personas que llaman a una ambulancia cuando notan los síntomas de padecer un infarto tienen más posibilidades de sobrevivir aunque aumente el tiempo de llegada al centro hospitalario, según los datos del Registro de Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (ARIAM) que ha analizado a lo largo de 2011 a 1.859 pacientes de 56 hospitales españoles.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Esto se debe a que, a pesar de que el tiempo de demora prehospitalaria ha aumentado en 2011 respecto a 2010 --se sitúa en una media de 163 minutos mientras que el año anterior era de 157 minutos--, los servicios de emergencia cuentan con tratamientos que consiguen paliar y disminuir los infartos. Y es que, la principal causa de este retraso se debe al tiempo que tardan los pacientes en solicitar ayuda médica --una media de 135 minutos--.



Este artículo sigue en el siguiente enlace:

<http://www.cantabrialiberal.com/noticia.php?id=155290&noticia=Llamar%20a%20una%20ambulancia%20por%20un%20infarto%20aumenta%20las%20posibilidades%20de%20sobrevivir%20aunque%20se%20demore%20a%20llegada%20al%20hospital>

TRATAMIENTO DE SALUD

## Llamar a una ambulancia por un infarto aumenta las posibilidades de sobrevivir aunque se demore la llegada al hospital

3/07/2012 13:08 | lainformacion.com

Las personas que llaman a una ambulancia cuando notan los síntomas de padecer un infarto tienen más posibilidades de sobrevivir aunque aumente el tiempo de llegada al centro hospitalario, según los datos del Registro de Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (ARIAM) que ha analizado a lo largo de 2011 a 1 859 **pacientes** de 56 hospitales españoles.

deja tu comentario [ 0 ]

Recomendar 1

Twitter 1

+1 0



publicidad

**Booking.com**

**Varsovia**  
Hotel Airport Okęcie

**Varsovia**  
Babka Tower Suites

**Varsovia**  
Hotel Gromada Airport



**Varsovia**  
Babka Tower Suites

**54 €**

ULTIMAS  
HABITACIONES

**BUSCAR**

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

[http://noticias.lainformacion.com/salud/tratamiento-de-salud/llamar-a-una-ambulancia-por-un-infarto-aumenta-las-posibilidades-de-sobrevivir-aunque-se-demore-la-llegada-al-hospital\\_FBrVWCik7MAPeGsBBGrgW2/](http://noticias.lainformacion.com/salud/tratamiento-de-salud/llamar-a-una-ambulancia-por-un-infarto-aumenta-las-posibilidades-de-sobrevivir-aunque-se-demore-la-llegada-al-hospital_FBrVWCik7MAPeGsBBGrgW2/)

## Ante un infarto, mejor llamar a una ambulancia

EP

Última revisión martes 03 de julio de 2012

Compartir  7  9    +1 0 



Los servicios de emergencia cuentan con tratamientos que consiguen paliar y disminuir los infartos.

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

<http://www.abc.es/salud/noticias/ante-infarto-mejor-llamar-ambulancia-12607.html>

## Ante un infarto llama a la ambulancia

Estudio afirmó que cuando una persona siente que sufrirá un infarto debe llamar a la ambulancia para recibir atención prehospitalaria



imprimir



Enviar

---

SUMEDICO

México D.F. a 3 de julio de 2012

---

Si crees que puedes estar presentando los síntomas de un **infarto**, debes de llamar a la ambulancia de inmediato, esto te garantizará tener más posibilidades de sobrevivir que si llegas por medios propios al hospital.

¿Y esto de qué podría depender?, de acuerdo con un informe obtenido luego de analizar el Registro de Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (ARIAM) con los casos de 2011 de mil 859 pacientes de 56 hospitales españoles, se encontró que aun cuando un paciente tarde más en llegar a una clínica en ambulancia que por sí solo, desde que llega la ambulancia ya está siendo atendido por un médico.

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

<http://www.sumedico.com/nota12241.html>

## Llamar a una ambulancia por un infarto aumenta las posibilidades de sobrevivir aunque se demore la llegada al hospital

3/07/2012 - 13:07



Puntúa la noticia :    Nota de los usuarios: - (0 votos)

 [España](#)  [Salud](#)



Las personas que llaman a una ambulancia cuando notan los síntomas de padecer un infarto tienen más posibilidades de sobrevivir aunque aumente el tiempo de llegada al centro hospitalario, según los datos del Registro de Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (ARIAM) que

ha analizado a lo largo de 2011 a 1.859 pacientes de 56 hospitales españoles.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Esto se debe a que, a pesar de que el tiempo de demora prehospitalaria ha aumentado en 2011

### Enlaces relacionados

[El fiscal jefe de la Audiencia Nacional dice que hay que acabar con la "simbología del terror" en las calles \(3/07\)](#)

[Eta. la audiencia nacional revisa todos los asesinatos de eta sin resolver \(3/07\)](#)

[Mediaset gana con España: Telecinco lidera la audiencia y Cuatro sube el 1,3% \(3/07\)](#)

[Oubiña se niega a declarar en la Audiencia Nacional y dice que lleva "25 años repitiendo lo mismo" \(2/07\)](#)

[El triunfo de 'la roja' ante Italia, el](#)

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

<http://ecodiario.economista.es/salud/noticias/4090964/07/12/Llamar-a-una-ambulancia-por-un-infarto-aumenta-las-posibilidades-de-sobrevivir-aunque-se-demore-la-llegada-al-hospital.html>

## Llamar a una ambulancia por un infarto aumenta las posibilidades de sobrevivir aunque se demore la llegada al hospital

03.07.12 | 13:07h. EUROPA PRESS | MADRID

**Las personas que llaman a una ambulancia cuando notan los síntomas de padecer un infarto tienen más posibilidades de sobrevivir aunque aumente el tiempo de llegada al centro hospitalario, según los datos del Registro de Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (ARIAM) que ha analizado a lo largo de 2011 a 1.859 pacientes de 56 hospitales españoles.**

Esto se debe a que, a pesar de que el tiempo de demora prehospitalaria ha aumentado en 2011 respecto a 2010 --se sitúa en una media de 163 minutos mientras que el año anterior era de 157 minutos--, los servicios de emergencia cuentan con tratamientos que consiguen paliar y disminuir los infartos. Y es que, la principal causa de este retraso se debe al tiempo que tardan los pacientes en solicitar ayuda médica --una media de 135 minutos--.

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

[http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Llamar-ambulancia-posibilidades-sobrevivir-hospital\\_0\\_1643835804.html](http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Llamar-ambulancia-posibilidades-sobrevivir-hospital_0_1643835804.html)

## Llamar a una ambulancia por un infarto aumenta las posibilidades de sobrevivir aunque se demore la llegada al hospital

POR CRÓNICA DE CANTABRIA – 03/07/2012



Las personas que llaman a una ambulancia cuando notan los síntomas de padecer un infarto tienen más posibilidades de sobrevivir aunque aumente el tiempo de llegada al centro hospitalario, según los datos del Registro de Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (ARIAM) que ha analizado a lo largo de 2011 a 1.859 pacientes de 56 hospitales españoles.

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

<http://cronicadecantabria.com/cr/llamar-a-una-ambulancia-por-un-infarto-aumenta-las-posibilidades-de-sobrevivir-aunque-se-demore-la-llegada-al-hospital/>

ENLACE DE INTERÉS

## Llamar a una ambulancia por un infarto aumenta las posibilidades de sobrevivir aunque se demore la llegada al hospital

3/07/2012 13:07 |  [Leer artículo completo en Europa Press](#)

Las personas que llaman a una ambulancia cuando notan los síntomas de padecer un infarto tienen más posibilidades de sobrevivir aunque aumente el tiempo de llegada al centro hospitalario, según los datos del Registro de Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (ARIAM) que ha analizado a lo largo de 2011 a 1.859 **pacientes** de 56 hospitales españoles.

## Llamar a una ambulancia por un infarto aumenta las posibilidades de sobrevivir aunque se demore la llegada al hospital

Me gusta 0

Twitter 0

+1 0

Comentar

### Agencias

[@DiarioSIGLOXXI](#)  
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Las personas que llaman a una ambulancia cuando notan los síntomas de padecer un infarto tienen más posibilidades de sobrevivir aunque aumente el tiempo de llegada al centro hospitalario, según los datos del Registro de Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (ARIAM) que ha analizado a lo largo de 2011 a 1.859 pacientes de 56 hospitales españoles.

Esto se debe a que, a pesar de que el tiempo de demora prehospitalaria ha aumentado en 2011 respecto a 2010 --se sitúa en una media de 163 minutos mientras que el año anterior era de 157 minutos--, los servicios de emergencia cuentan con tratamientos que consiguen paliar y disminuir los infartos. Y es que, la principal causa de este retraso se debe al tiempo que tardan los pacientes en solicitar ayuda médica --una media de 135 minutos--.



» Ampliar la imagen

Este artículo sigue en el siguiente enlace:



<http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20120703130735/llamar-a-una-ambulancia-por-un-infarto-aumenta-las-posibilidades-de-sobrevivir-aunque-se-demore-la-llegada-al-hospital>

## Llamar a una ambulancia es la mejor opción ante un infarto



Salud y calidad de vida

Martes, 03 de Julio de 2012 12:16



**-El resultado obtenido de esta investigación ha demostrado que una reducción de la demora prehospitolaria podría contribuir a reducir el 26 por ciento de los fallecimientos por esta causa. Y es que, actualmente, la mortalidad hospitalaria se sitúa en un 6,9 por ciento y, de ese porcentaje, el 3,9 por ciento de los pacientes fallecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).**

Las personas que llaman a una ambulancia cuando notan los síntomas de padecer un infarto tienen más posibilidades de sobrevivir aunque aumente el tiempo de llegada al centro hospitalario, según los datos del Registro de Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (ARIAM) que ha analizado a lo largo de 2011 a 1.859 pacientes de 56 hospitales españoles.

Esto se debe a que, a pesar de que el tiempo de demora prehospitolaria ha aumentado en 2011 respecto a 2010 -se sitúa en una media de 163 minutos mientras que el año anterior era de 157 minutos-, los servicios de emergencia cuentan con tratamientos que

consiguen paliar y disminuir los infartos. Y es que, la principal causa de este retraso se debe al tiempo que tardan los pacientes en solicitar ayuda médica -una media de 135 minutos-. "Cuando un paciente acude por medios propios lo hace sin tener ningún tipo de asistencia pero cuando una persona es transportada por un medio de emergencia aunque tarde un poco mas es una persona que está tratada por un médico, una enfermera en una UCI móvil que en muchas veces ha sido tratada con un tratamiento precoz y que ya su proceso está siendo monitorizado, tratado y tutelado previamente", ha comentado el secretario de la Sociedad Española de Medicina Intensiva (Semicyuc), Frutos del Nogal.

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

<http://yucatanhoy.com/salud-y-calidad-de-vida/llamar-a-una-ambulancia-es-la-mejor-opcion-ante-un-infarto.html>

## **Llamar a una ambulancia por un infarto aumenta las posibilidades de sobrevivir aunque se demore la llegada al hospital**

Publicado el 07/03/2012 por Administrador

**YAHOO!**

Las personas que llaman a una ambulancia cuando notan los síntomas de padecer un infarto tienen más posibilidades de sobrevivir aunque aumente el tiempo de llegada al centro hospitalario, según los datos del Registro de Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (ARIAM) que ha analizado a lo largo de 2011 a 1.859 pacientes de 56 hospitales...



Este video se puede ver en el siguiente enlace: (minuto 30:25)

[http://www.rtpa.es/video:TPA%20Noticias.%20Primera%20Edici%C3%B3n\\_1341329424.html](http://www.rtpa.es/video:TPA%20Noticias.%20Primera%20Edici%C3%B3n_1341329424.html)

# Semicyuc

**LOS PROFESIONALES DEL ENFERMO CRÍTICO**

**La demora en la llegada a  
UCI, peor dato en el  
abordaje de IAM**

**4 de JULIO 2012**

# DIARIO MEDICO.COM

INICIO | **ÁREA CIENTÍFICA** | **ÁREA PROFESIONAL** | OPINIÓN / PARTICIPACIÓN | MULTIMEDIA | FORMACIÓN | CC

Sanidad | Profesión | Normativa | Gestión | Entorno | La consulta |

[Portada](#) > [Área Profesional](#) > [Gestión](#)

SEGÚN EL ÚLTIMO CORTE ANUAL DEL REGISTRO ARIAM

## La demora en la llegada a UCI, peor dato en el abordaje de IAM

Según los últimos datos del Registro de Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (Ariam), elaborado por Semicyuc, aunque la mortalidad por esta patología desciende paulatinamente por la mejora de los tratamientos, la demora en el acceso a ellos empeora.

Rosalía Sierra | 04/07/2012 00:00

☆☆☆☆☆ [votar](#) | [0 comentarios](#)

[imprimir](#) | [tamaño](#)  

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha concedido el aval como herramienta de utilidad médica al Registro de Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (Ariam), "el único registro que controla de forma constante con cortes anuales -y recogida trimestral de datos- el número de pacientes ingresados en los centros de salud pública que han sufrido un infarto agudo de miocardio", según anunció ayer el presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc), José Cuñat.

El registro, que incluye 17 indicadores de calidad, permite "avanzar hacia la excelencia en procedimientos y resultados. Los hospitales participantes -56 en toda España- pueden compararse con la media, con otros centros y con ellos mismos para medir su evolución", explicó Frutos del Nogal, secretario de Semicyuc y responsable del registro.

# La demora en la llegada a UCI, peor dato en el abordaje de IAM

→ Según los últimos datos del Registro de Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (Ariam), elaborado por Semicyuc, aunque la

mortalidad por esta patología descende paulatinamente por la mejora de los tratamientos, la demora en el acceso a ellos empeora.

## ■ Rosalía Sierra

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha concedido el aval como herramienta de utilidad médica al Registro de Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (Ariam), "el único registro que controla de forma constante con cortes anuales y recogida trimestral de datos el número de pacientes ingresados en los centros de salud pública que han sufrido un infarto agudo de miocardio", según anunció ayer el presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc), José Cuñat.

El registro, que incluye 17 indicadores de calidad, permite "avanzar hacia la exce-

"Entre un tercio y la mitad de los pacientes que mueren por esta causa lo hacen en la primera hora tras el infarto, la mayor parte de las veces antes de llegar al hospital", afirmó Cuñat. Por ello, cree que es preciso "promover campañas de concienciación ciudadana sobre los síntomas y la importancia de avisar lo antes posible a los servicios de emergencias". En este sentido, el presidente de Semicyuc apuntó que es preferible esta vía que acudir directamente al hospital, dado que, "según el último corte del registro, hasta el 21 por ciento de las administraciones de fibrinolíticos se han realizado en UCI móvil".

Por su parte, Del Nogal

matizó que "si los pacientes accedieran antes al sistema sanitario se podrían evitar en torno al 25 por ciento de las muertes".

## Hacia la excelencia

Más allá de este grave problema de tiempo, el resto de los indicadores son bastante satisfactorios: "Se han reducido la mortalidad en UCI -que está en el 3,9 por ciento- y en toda la estancia hospitalaria -6,9 por ciento-", detalló Del Nogal.

Además, según explicó Cuñat, "cada vez hay más seguimiento de las vías clínicas, se han mejorado los tratamientos y hay una mayor concienciación de los médicos implicados en el aborda-

je del infarto sobre la importancia de aplicar tempranamente tratamientos como trombolisis y angioplastia".

El registro permite también conocer la evolución del uso de estos tratamientos: "Según los estudios, los antiagregantes y betabloqueantes mejoran el pronóstico de los pacientes infartados, y gracias al registro podemos observar el nivel de uso de estos fármacos y medir su efectividad real fuera de ensayos clínicos, así como detectar qué hospitales se acercan más a la excelencia para aprender de ellos". Lo mismo sucede con el empleo de ecocardiografía y fibrinolíticos fuera de las unidades coronarias.

lencia en procedimientos y resultados. Los hospitales participantes -56 en toda España- pueden compararse con la media, con otros centros y con ellos mismos para medir su evolución", explicó Frutos del Nogal, secretario de Semicyuc y responsable del registro.

Según los datos aportados por el corte de 2011, realizado sobre un total de 1.859 pacientes, la sociedad científica constata que persiste una importante demora prehospitalaria en la atención a los pacientes infartados, con una mediana de 157 minutos en 2010 y de 163 minutos en 2011.



José Cuñat y Frutos del Nogal, ayer durante la presentación de Ariam.

# Semicyuc

**LOS PROFESIONALES DEL ENFERMO CRÍTICO**

**El 61,3% De las muertes  
hospitalarias en pacientes  
ingresados con infarto de  
miocardio se producen por  
shock cardiogénico**

**12 de JULIO 2012**

Estás en: El Norte de Castilla > Vida y Ocio > Últimas noticias > Más del 60% de muertes en ingresados por infarto son por shock cardiogénico

ÚLTIMAS NOTICIAS DE VIDA Y OCIO 12:15

## Más del 60% de muertes en ingresados por infarto son por shock cardiogénico

Noticias EFE

Madrid, 12 jul (EFE).- El 61,3 por ciento de las muertes hospitalarias por síndrome coronario agudo se producen en pacientes con un shock cardiogénico, según la Sociedad Española de Medicina Intensiva (SEMICYUC).

Así, en su informe correspondiente a 2011 y elaborado con datos del Registro de Análisis del Retraso en el Infarto agudo de Miocardio (ARIAM), se señala que el 66,7 por ciento de los pacientes con Síndrome Coronario Agudo con Elevación persistente del segmento ST, SCACEST, es decir, personas que presentan un daño miocárdico pronunciado, fallecen en el hospital debido a un shock cardiogénico.

El shock cardiogénico se produce cuando el corazón está tan dañado que es incapaz de suministrar suficiente sangre al organismo.

**CELÉBRALO CON NOSOTROS**



**eDreams**  
*viajamos contigo*

**Valverde - Tenerife**  
desde **40,22 €** **RESERVA AHORA**

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

[http://www.elnortedecastilla.es/agencias/20120712/mas-actualidad/vida-ocio/muertes-ingresados-infarto-shock-cardiogenico\\_201207121215.html](http://www.elnortedecastilla.es/agencias/20120712/mas-actualidad/vida-ocio/muertes-ingresados-infarto-shock-cardiogenico_201207121215.html)

Estás en: [diariovasco.com](#) > [Sociedad](#) > [Últimas noticias](#) > [Más del 60% de muertes en ingresados por infarto son por shock cardiogénico](#)

ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD 12:15

## Más del 60% de muertes en ingresados por infarto son por shock cardiogénico

Noticias EFE

Madrid, 12 jul (EFE).- El 61,3 por ciento de las muertes hospitalarias por síndrome coronario agudo se producen en pacientes con un shock cardiogénico, según la Sociedad Española de Medicina Intensiva (SEMICYUC).

Así, en su informe correspondiente a 2011 y elaborado con datos del Registro de Análisis del Retraso en el Infarto agudo de Miocardio (ARIAM), se señala que el 66,7 por ciento de los pacientes con Síndrome Coronario Agudo con Elevación persistente del segmento ST, SCACEST, es decir, personas que presentan un daño miocárdico pronunciado, fallecen en el hospital debido a un shock cardiogénico.

El shock cardiogénico se produce cuando el corazón está tan dañado que es incapaz de suministrar suficiente sangre al organismo.

De igual modo, el 50 por ciento de los pacientes que presentan un daño miocárdico menos pronunciado, tampoco consiguen superar su patología.

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

[http://www.diariovasco.com/agencias/20120712/mas-actualidad/sociedad/muertes-ingresados-infarto-shock-cardiogenico\\_201207121215.html](http://www.diariovasco.com/agencias/20120712/mas-actualidad/sociedad/muertes-ingresados-infarto-shock-cardiogenico_201207121215.html)

Tu nuevo referente científico de

**diariovasco.com**

CADA SEGUNDO...  
...CUENTA EN BOLSA

**diariovasco.tv**



Estás en: Granada - Ideal > Sociedad > Últimas noticias > Más del 60% de muertes en ingresados por infarto son por shock cardiogénico

ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD 12:15

## Más del 60% de muertes en ingresados por infarto son por shock cardiogénico

Noticias EFE

Madrid, 12 jul (EFE).- El 61,3 por ciento de las muertes hospitalarias por síndrome coronario agudo se producen en pacientes con un shock cardiogénico, según la Sociedad Española de Medicina Intensiva (SEMICYUC).

Así, en su informe correspondiente a 2011 y elaborado con datos del Registro de Análisis del Retraso en el Infarto agudo de Miocardio (ARIAM), se señala que el 66,7 por ciento de los pacientes con Síndrome Coronario Agudo con Elevación persistente del segmento ST, SCACEST, es decir, personas que presentan un daño miocárdico pronunciado, fallecen en el hospital debido a un shock cardiogénico.

El shock cardiogénico se produce cuando el corazón está tan dañado que es incapaz de suministrar suficiente sangre al organismo.



Este artículo sigue en el siguiente enlace:

[http://www.ideal.es/agencias/20120712/mas-actualidad/sociedad/muertes-ingresados-infarto-shock-cardiogenico\\_201207121215.html](http://www.ideal.es/agencias/20120712/mas-actualidad/sociedad/muertes-ingresados-infarto-shock-cardiogenico_201207121215.html)



Estás en: larioja.com > Sociedad > Últimas noticias > Más del 60% de muertes en ingresados por infarto son por shock cardiogénico

ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD 12:15

# Más del 60% de muertes en ingresados por infarto son por shock cardiogénico

Noticias EFE

Madrid, 12 jul (EFE).- El 61,3 por ciento de las muertes hospitalarias por síndrome coronario agudo se producen en pacientes con un shock cardiogénico, según la Sociedad Española de Medicina Intensiva (SEMICYUC).

Así, en su informe correspondiente a 2011 y elaborado con datos del Registro de Análisis del Retraso en el Infarto agudo de Miocardio (ARIAM), se señala que el 66,7 por ciento de los pacientes con Síndrome Coronario Agudo con Elevación persistente del segmento ST, SCACEST, es decir, personas que presentan un daño miocárdico pronunciado, fallecen en el hospital debido a un shock cardiogénico.

El shock cardiogénico se produce cuando el corazón está tan dañado que es incapaz de suministrar suficiente sangre al organismo.

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

[http://www.larioja.com/agencias/20120712/mas-actualidad/sociedad/muertes-ingresados-infarto-shock-cardiogenico\\_201207121215.html](http://www.larioja.com/agencias/20120712/mas-actualidad/sociedad/muertes-ingresados-infarto-shock-cardiogenico_201207121215.html)

Consulta toda la  
información  
meteorológica en la  
nueva sección de  
**Eltiempo**

Estás en: hoy.es > Sociedad y Cultura > Últimas noticias > Más del 60% de muertes en ingresados por infarto son por shock cardiogénico

ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD Y CULTURA 12:15

## Más del 60% de muertes en ingresados por infarto son por shock cardiogénico

Noticias EFE

0 Comentarios |  0  0  Compartir  0

★★★★★ 0 votos

Madrid, 12 jul (EFE).- El 61,3 por ciento de las muertes hospitalarias por síndrome coronario agudo se producen en pacientes con un shock cardiogénico, según la Sociedad Española de Medicina Intensiva (SEMICYUC).

Así, en su informe correspondiente a 2011 y elaborado con datos del Registro de Análisis del Retraso en el Infarto agudo de Miocardio (ARIAM), se señala que el 66,7 por ciento de los pacientes con Síndrome Coronario Agudo con Elevación persistente del segmento ST, SCACEST, es decir, personas que presentan un daño miocárdico pronunciado, fallecen en el hospital debido a un shock cardiogénico.

El shock cardiogénico se produce cuando el corazón está tan dañado que es incapaz de suministrar suficiente sangre al organismo.

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

[http://www.hoy.es/agencias/20120712/mas-actualidad/sociedad/muertes-ingresados-infarto-shock-cardiogenico\\_201207121215.html](http://www.hoy.es/agencias/20120712/mas-actualidad/sociedad/muertes-ingresados-infarto-shock-cardiogenico_201207121215.html)



EL CORAZÓN ES INCAPAZ DE SUMINISTRAR SANGRE A OTROS ÓRGANOS

## Más de la mitad de las muertes hospitalarias por infarto de miocardio se producen tras un 'shock' cardiogénico

Deja tu comentario

Imprimir Enviar

COMPARTE ESTA NOTICIA

1 enviar

menear tuenti

+1 0

Gestión anuncios [D]

**¿Sufre de fibromialgia?**

No se desespere y cobre ánimo reciba gratis asesoramiento.  
[www.espaldas.eu/fibro...](http://www.espaldas.eu/fibro...)

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 61,3 por ciento de las muertes hospitalarias por síndrome coronario agudo se producen en pacientes con un 'shock' cardiogénico, un estado por el que el corazón que ha quedado dañado es incapaz de suministrar suficiente sangre a los órganos del cuerpo.

Así se desprende de los últimos datos recabados por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) de su registro de análisis del retraso en el infarto agudo de miocardio ARIAM, relativos a 2011.

Dicho registro ha mostrado también que el 66,7 por ciento de los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación persistente del segmento ST (SCACEST) fallecen en el hospital a causa de un 'shock' cardiogénico mientras que, del resto, la mitad tampoco consiguen superar su patología.

Además, existe un alto índice de pacientes que fallecen a causa de una muerte súbita con fibrilación ventricular, o disociación electromecánica, ya que representan el 19,4 por ciento de estos fallecimientos.

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

<http://www.europapress.es/salud/salud-bienestar-00667/noticia-mas-mitad-muertes-hospitalarias-infarto-miocardio-producen-shock-cardiogenico-20120712124146.html>

---

## Más de la mitad de las muertes hospitalarias por infarto de miocardio se producen tras un 'shock' cardiogénico

---

12.07.12 | 12:07h. EUROPA PRESS | MADRID

**El 61,3 por ciento de las muertes hospitalarias por síndrome coronario agudo se producen en pacientes con un 'shock' cardiogénico, un estado por el que el corazón que ha quedado dañado es incapaz de suministrar suficiente sangre a los órganos del cuerpo.**

Así se desprende de los últimos datos recabados por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) de su registro de análisis del retraso en el infarto agudo de miocardio ARIAM, relativos a 2011.

Dicho registro ha mostrado también que el 66,7 por ciento de los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación persistente del segmento ST (SCACEST) fallecen en el hospital a causa de un 'shock' cardiogénico mientras que, del resto, la mitad tampoco consiguen superar su patología.

Además, existe un alto índice de pacientes que fallecen a causa de una muerte súbita con fibrilación ventricular, o disociación electromecánica, ya que representan el 19,4 por ciento de estos fallecimientos.

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

[http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/hospitalarias-infarto-miocardio-producen-cardiogenico\\_0\\_1649235237.html](http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/hospitalarias-infarto-miocardio-producen-cardiogenico_0_1649235237.html)

## Más de la mitad de las muertes hospitalarias por infarto de miocardio se producen tras un 'shock' cardiogénico



Jueves, 12 de Julio de 2012 (hace 3 semanas)

El 61,3 por ciento de las muertes hospitalarias por síndrome coronario agudo se producen en pacientes con un 'shock' cardiogénico, un estado por el que el corazón que ha quedado dañado es incapaz de suministrar suficiente sangre a los órganos del cuerpo.

## Más de la mitad de las muertes hospitalarias por infarto de miocardio se producen tras un 'shock' cardiogénico

El 61,3 por ciento de las muertes hospitalarias por síndrome coronario agudo se producen en pacientes con un 'shock' cardiogénico, un estado por el que el corazón que ha quedado dañado es incapaz de suministrar suficiente sangre a los órganos del cuerpo.

Compartir +1 0 menéalo Twittear 0 Me gusta 0

Resultado: ★★★★★

0 Comentarios

Así se desprende de los últimos datos recabados por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) de su registro de análisis del retraso en el infarto agudo de miocardio ARIAM, relativos a 2011.

Dicho registro ha mostrado también que el 66,7 por ciento de los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación persistente del segmento ST (SCACEST) fallecen en el hospital a causa de un 'shock' cardiogénico mientras que, del resto, la mitad tampoco consiguen superar su patología.

Además, existe un alto índice de pacientes que fallecen a causa de una muerte súbita con fibrilación ventricular, o disociación electromecánica, ya que representan el 19,4 por ciento de estos fallecimientos.

En el caso del SCASEST, hasta un 20 por ciento de los fallecimientos se deben a causas no cardiológicas, de ahí que los intensivistas aconsejen su ingreso en unidades polivalentes en detrimento de las unidades monográficas exclusivamente cardiológicas.

### Buscar en Terra Noticias

**YO PIENSO DIFERSO** Yo pienso distinto en Facebook  
 16,232

PUBLICIDAD

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

<http://noticias.terra.es/2012/espana/0712/actualidad/mas-de-la-mitad-de-las-muertes-hospitalarias-por-infarto-de-miocardio-se-producen-tras-un-shock-cardiogenico.aspx>

## Más de la mitad de las muertes hospitalarias por infarto de miocardio se producen tras un 'shock' cardiogénico

JANO.es · 12 Julio 2012 12:58

Vota ☆☆☆☆☆ Resultado ★★★★★ 2 votos

Comentarios - 0

*Así se desprende de los datos recabados por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) de su registro de análisis del retraso en el infarto agudo de miocardio ARIAM, relativos a 2011.*

El 61,3% de las muertes hospitalarias por síndrome coronario agudo se producen en pacientes con un 'shock' cardiogénico, un estado por el que el corazón que ha quedado dañado es incapaz de suministrar suficiente sangre al resto de los órganos. Así se desprende de los últimos datos recabados por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) de su registro de análisis del retraso en el infarto agudo de miocardio ARIAM, relativos a 2011.

Dicho registro muestra también que el 66,7% de los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación persistente del segmento ST (SCACEST) fallecen en el hospital a causa de un 'shock' cardiogénico, mientras que, del resto, la mitad tampoco consiguen superar su patología. Además, se da un alto índice de pacientes que fallecen debido a una muerte súbita con fibrilación ventricular, o disociación electromecánica, que representan el 19,4% de estos fallecimientos.

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

[http://www.jano.es/jano/actualidad/ultimas/noticias/janoes/mas/mitad/muertes/hospitalarias/infarto/miocardio/producen/tras/shock/cardiogenico/\\_f-11+iditem-17586+idtabla-1](http://www.jano.es/jano/actualidad/ultimas/noticias/janoes/mas/mitad/muertes/hospitalarias/infarto/miocardio/producen/tras/shock/cardiogenico/_f-11+iditem-17586+idtabla-1)



## **CARDIOLOGÍA**

### Más de la mitad de las muertes hospitalarias por infarto de miocardio se producen tras un 'shock' cardiogénico

JANO.es · 12 Julio 2012 12:58

Así se desprende de los datos recabados por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) de su registro de análisis del retraso en el infarto agudo de miocardio ARIAM, relativos a 2011.

El 61,3% de las muertes hospitalarias por síndrome coronario agudo se producen en pacientes con un 'shock' cardiogénico, un estado por el que el corazón que ha quedado dañado es incapaz de suministrar suficiente sangre al resto de los órganos. Así se desprende de los últimos datos recabados por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) de su registro de análisis del retraso en el infarto agudo de miocardio ARIAM, relativos a 2011.

Dicho registro muestra también que el 66,7% de los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación persistente del segmento ST (SCAEST) fallecen en el hospital a causa de un 'shock' cardiogénico, mientras que, del resto, la mitad tampoco consiguen superar su patología. Además, se da un alto índice de pacientes que fallecen debido a una muerte súbita con fibrilación ventricular, o disociación electromecánica, que representan el 19,4% de estos fallecimientos.

En el caso del SCAEST, hasta un 20% de los fallecimientos se deben a causas no cardiológicas, de ahí que los intensivistas aconsejen el ingreso del paciente en unidades polivalentes en detrimento de las unidades monográficas exclusivamente cardiológicas. Asimismo, insisten en la necesidad de que los pacientes avisen al médico en los primeros síntomas de un accidente cardiovascular y, del mismo modo, reclaman que no haya pasividad terapéutica en la atención prehospitalaria del síndrome coronario agudo en relación con el uso de la 'Aspirina', la realización de un electrocardiograma prehospitalario y la monitorización del paciente.

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

<http://www.atencionprimariasalud.es/documentacion-otros-medios/mas-de-la-mitad-de-las-muertes-hospitalarias-por-infarto-de-miocardio-se-producen-tras-un-shock-cardiogenico-jano-es-elsevier>

## Más de la mitad de las muertes hospitalarias por infarto de miocardio se producen tras un 'shock' cardiogénico

EL CORAZÓN ES INCAPAZ DE SUMINISTRAR SANGRE A OTROS ÓRGANOS

 Europa Press – jue, 12 jul 2012

 Correo electrónico  Recomendar  Twittear 8  Share  Imprimir

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El 61,3 por ciento de las muertes hospitalarias por síndrome coronario agudo se producen en pacientes con un 'shock' cardiogénico, un estado por el que el corazón que ha quedado dañado es incapaz de suministrar suficiente sangre a los órganos del cuerpo.

Así se desprende de los últimos datos recabados por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) de su registro de análisis del retraso en el infarto agudo de miocardio ARIAM, relativos a 2011.

Dicho registro ha mostrado también que el 66,7 por ciento de los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación persistente del segmento ST (SCACEST) fallecen en el hospital a causa de un 'shock' cardiogénico mientras que, del resto, la mitad tampoco consiguen superar su patología.

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

<http://es.noticias.yahoo.com/mitad-muertes-hospitalarias-infarto-miocardio-producen-shock-cardiog%C3%A9nico-104146182.html>

**iberoamérica.net / española**  
Las noticias que se leen ahora en las redes sociales



**cuatro**  
15.525 artículos de 43 cabeceras



Portada > España > Prensa generalista > es.yahoo.com

## Más de la mitad de las muertes hospitalarias por infarto de miocardio se producen tras un 'shock'

1 [http://es.noticias.yahoo.com/mitad-muertes-hospitalarias-infarto-miocardio-producen-shock-cardiaco-104146182.html?\\_ylt=Asd62pA5vp4lloInaXyE4P9nf0l;\\_ylu=X3oDMTrtZmxtdnBjBG1pdANUb3BTdG9yeSB0aWVvY2lhU0YgU2FsdWRTU0YgTUQEeGtnAzYxNTY5ZDg5LTY3NzA1MzQxYi04-\\_ylg=X3oDMTFydnRzaW83BGJludGwDZXMEbGFuZwllcy1lcwRwc3RhaWQDBHBzdGhhdANjaWVvY2lhfHNhbHVkBHB0A3NlY3Rpb25z;\\_ylv=3](http://es.noticias.yahoo.com/mitad-muertes-hospitalarias-infarto-miocardio-producen-shock-cardiaco-104146182.html?_ylt=Asd62pA5vp4lloInaXyE4P9nf0l;_ylu=X3oDMTrtZmxtdnBjBG1pdANUb3BTdG9yeSB0aWVvY2lhU0YgU2FsdWRTU0YgTUQEeGtnAzYxNTY5ZDg5LTY3NzA1MzQxYi04-_ylg=X3oDMTFydnRzaW83BGJludGwDZXMEbGFuZwllcy1lcwRwc3RhaWQDBHBzdGhhdANjaWVvY2lhfHNhbHVkBHB0A3NlY3Rpb25z;_ylv=3)

## **Más de la mitad de las muertes hospitalarias por infarto de miocardio se producen tras un 'shock' cardiogénico**

Publicado el 07/12/2012 por Administrador

YAHOO!

El 61,3 por ciento de las muertes hospitalarias por síndrome coronario agudo se producen en pacientes con un 'shock' cardiogénico, un estado por el que el corazón que ha quedado dañado es incapaz de suministrar suficiente sangre a los órganos del cuerpo...

**SEMICYUC apuesta por intensificar la terapéutica pre hospitalaria tras el infarto para rebajar las defunciones por shock cardiogénico ▶ El Médico Interactivo, Diario Electrónico de la Sanidad**

BOSSIER SEMICYUC

JULIO 2012

[El Médico Interactivo, Diario Electrónico de la Sanidad SEMICYUC apuesta por intensificar la terapéutica pre hospitalaria tras el infarto para rebajar las defunciones por shock cardiogénico](#)

## **SEMICYUC apuesta por intensificar la terapéutica pre hospitalaria tras el infarto para rebajar las defunciones por shock cardiogénico**

Madrid (13/07/2012) - Redacción

**El 61,3 por ciento de las muertes hospitalarias en pacientes ingresados por un paro cardíaco se producen por este tipo de shock**

Según el Registro de Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio, ARIAM, de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, en su último informe correspondiente al corte de 2011, el 61,3 por ciento de las muertes hospitalarias por síndrome coronario agudo se producen en pacientes que padecen un shock cardiogénico.

El registro ARIAM revela que el 66,7 por ciento de los pacientes con Síndrome Coronario Agudo Con Elevación persistente del segmento ST, SCACEST fallecen en el hospital a causa de un shock

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

<http://saludequitativa.blogspot.com.es/2012/07/semicyuc-apuesta-por-intensificar-la.html>

The screenshot shows the top navigation bar of the website 'El Médico Interactivo'. It includes a 'saneo' logo, the title 'El Médico Interactivo', and sub-sections for 'El Médico Estudiantes' and 'El Médico Residentes'. Below the navigation is a news banner with the headline 'Última Hora Expertos adelantan que los resultados de un estudio podrían acercar la vacuna contra el Alzheimer'. The banner also features a 'BOE' logo and a 'REPORTAJE' section with the sub-headline 'La carrera profesional: lo que la crisis se llevó'.

## SEMICYUC apuesta por intensificar la terapéutica pre hospitalaria tras el infarto para rebajar las defunciones por shock cardiogénico

- Enviar Noticia
- Imprimir
- Vota
- Comentar
- Compartir
- Like
- f t in
- +1 0

Madrid (13/07/2011) - Redacción

### El 61,3 por ciento de las muertes hospitalarias en pacientes ingresados por un paro cardíaco se producen por este tipo de shock

Según el Registro de Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio, ARIAM, de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, en su último informe correspondiente al corte de 2011, el 61,3 por ciento de las muertes hospitalarias por síndrome coronario agudo se producen en pacientes que padecen un shock cardiogénico.

El registro ARIAM revela que el 66,7 por ciento de los pacientes con Síndrome Coronario Agudo Con Elevación persistente del segmento ST, SCASEST fallecen en el hospital a causa de un shock cardiogénico. Del mismo modo que la mitad de los enfermos con Síndrome Coronario Agudo Sin Elevación persistente del segmento ST, SCASEST, tampoco consiguen superar su patología.

Destaca también el alto índice de pacientes que fallecen a causa de la Muerte Súbita con fibrilación ventricular, o disociación electromecánica, con un 19,4 por ciento de las muertes. En el caso del SCASEST, hasta un 20 por ciento de los fallecimientos se deben a causas no cardiológicas, lo que aconsejaría su ingreso en Unidades polivalentes en detrimento de las unidades monográficas exclusivamente cardiológicas.

Según los especialistas, la medida más conveniente es avisar urgentemente al servicio de emergencias 112 ante los síntomas de infarto.

El informe subraya que en una cuarta parte de los pacientes que acuden por el sistema sanitario no se registra un ECG pre hospitalario y más de la mitad ingresa sin monitorización y sin administración de antiagregantes lo cual complica el seguimiento del paciente y por lo tanto su recuperación.

## La Cruz Roja imparte un nuevo curso de Soporte Vital Básico

El interés principal del proyecto está centrado en el manejo de desfibriladores

S. H. / HUELVA | ACTUALIZADO 24.07.2012 - 01:00

0 comentarios 1 voto

Me gusta

Twitter 0

COMPARTIR

La Asamblea Provincial de Cruz Roja va a impartir un curso de Soporte Vital Básico y Desfibrilación Externa Semiautomática. El curso es totalmente acorde a los protocolos marcados por el Plan Nacional de reanimación cardiopulmonar (RCP) de la Semicyuc y el European Resuscitation Council que aborda el Soporte Vital Básico y el manejo de los desfibriladores externos automáticos y semiautomáticos. La certificación obtenida es la que actualmente acepta la Junta de Andalucía, entre otras comunidades autónomas, para autorizar el uso de DEA/DESA por personal no médico.

Será impartido por instructores totalmente capacitados del Plan Nacional de RCP con amplia experiencia en actuación en situaciones críticas.

El objetivo final del curso es aportar los conocimientos y destrezas necesarios para poder realizar una primera atención en paradas cardiacas hasta la llegada de los equipos especializados. Por ello, al finalizar el curso, los alumnos y alumnas deberán ser capaces de identificar el obstrucción de la vía aérea y la parada cardiaca en pacientes inconscientes, así como de alertar a los dispositivos de emergencia con la máxima urgencia. Los participantes deberán demostrar capacidad para aplicar los conocimientos teóricos y prácticos incluidos en el programa.

# Semicyuc

**LOS PROFESIONALES DEL ENFERMO CRÍTICO**

La mitad de los ingresados en  
la UCI por infarto padece  
sobrepeso

**24 de JULIO 2012**

## La mitad de los ingresados en la UCI por infarto padece sobrepeso

La mitad de los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por enfermedades coronarias padece sobrepeso y otro 25 por ciento tiene obesidad.



La mitad de los ingresados en la UCI por infarto padece sobrepeso

24 Julio 12 - Madrid - Efe

 **Doble clic** sobre cualquier palabra para ver **significado**

Así lo advierte hoy, en un comunicado, la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (Semicyuc), que ha señalado que el 31,4 por ciento de los enfermos ingresados

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

<http://www.larazon.es/noticia/9817-la-mitad-de-los-ingresados-en-la-uci-por-infarto-padece-sobrepeso>

## La mitad de los ingresados en la UCI por infarto padece sobrepeso

- ▶ La obesidad, el aumento del colesterol, la hipertensión arterial y al hábito de fumar, son los factores más presentes en los pacientes que padecen un infarto agudo de miocardio

EFE / MADRID

Día 24/07/2012 - 12.38h



Sigue ABC.es en..



Tuenti

Publicidad

ABC, ÚLTIMA HORA

Un secuestrador de Ortega  
**un hospital de País Va**

Una juez de Palma ordena  
**Mateos** por no comparece

La Alhambra abrirá al  
**Puerta de los Siete Sue**

Uzbekistán **suspende l**  
**telefonía móvil** tempor  
copie en la Selectividad

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

<http://www.abc.es/20120724/sociedad/abci-ingresados-ucis-infarto-sobrepeso-201207241139.html>



Estás en: El Diario Montañés > Sociedad > Últimas noticias > La mitad de los ingresados en la UCI por infarto padece sobrepeso

ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD 11:23

## La mitad de los ingresados en la UCI por infarto padece sobrepeso

Noticias EFE

Madrid, 23 jul (EFE).- La mitad de los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por enfermedades coronarias padece sobrepeso y otro 25 por ciento tiene obesidad.

Así lo advierte hoy, en un comunicado, la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (Semicyuc), que ha señalado que el 31,4 por ciento de los enfermos ingresados presenta riesgo coronario por sobrepeso y obesidad.

Estos datos, recogidos en el Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (Ariam), elaborado por esta sociedad, revelan que la obesidad, junto al aumento del colesterol, la hipertensión arterial y al hábito de fumar, son los factores más presentes en los pacientes que padecen un infarto agudo de miocardio.

De esta manera, los intensivistas españoles recomiendan a las personas con sobrepeso acudir a su médico de Atención Primaria o a un endocrino para realizar dietas, y "nunca acudir a otros métodos por iniciativa propia o por recomendaciones de fuentes no especializadas", como amigos o familiares.



Este artículo sigue en el siguiente enlace:

[http://www.eldiariomontanes.es/agencias/20120724/mas-actualidad/sociedad/mitad-ingresados-infarto-padece-sobrepeso\\_201207241123.html](http://www.eldiariomontanes.es/agencias/20120724/mas-actualidad/sociedad/mitad-ingresados-infarto-padece-sobrepeso_201207241123.html)

## La mitad de los ingresados en la UCI por infarto padece sobrepeso

24/07/2012 (efe)

Comentar

Twitter 0

Compartir 0

Share



La mitad de los ingresados en la UCI por infarto padece sobrepeso

La mitad de los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por enfermedades coronarias padece sobrepeso y otro 25 por ciento tiene obesidad.

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

<http://www.finanzas.com/noticias-001/sociedad/20120724/mitad-ingresados-infarto-padece-1471891.html>



## La mitad de los ingresados en la UCI por infarto padece sobrepeso

24/jul/12 11:44 ★★★★★ 0 votos

Edición digital Sin comentarios



0

Me gusta

Twitter 0



Este artículo sigue en el siguiente enlace:

<http://www.eldia.es/2012-07-24/sociedad/4-mitad-ingresados-UCI-infarto-padece-sobrepeso.htm>



Portada

Nacional

Internacional

Economía

Deportes

Ocio y Cultura

Sociedad

Ciencia y Te

## La mitad de los ingresados en la UCI por infarto padece sobrepeso

11:39 (24-07-12) Medio: ABC Categoría: Sociedad

La mitad de los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por enfermedades coronarias padece sobrepeso y otro 25 por ciento tiene obesidad. Así lo advierte este martes, en un comunicado, la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (Semicyuc), que ha señalado que el 31,4 por ciento de los enfermos ingresados presenta riesgo coronario [Leer noticia...](#)

## LA MITAD DE LOS PACIENTES INGRESADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) POR ENFERMEDADES CORONARIAS PADECE SOBREPESO Y OTRO 25 POR CIENTO TIENE OBESIDAD.

Efe

Así lo advierte hoy, en un comunicado, la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (Semicyuc), que ha señalado que el 31,4 por ciento de los enfermos ingresados presenta riesgo coronario por sobrepeso y obesidad.

Estos datos, recogidos en el Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (Ariam), elaborado por esta sociedad, revelan que la obesidad, junto al aumento del colesterol, la hipertensión arterial y al hábito de fumar, son los factores más presentes en los pacientes que padecen un infarto agudo de miocardio.



De esta manera, los intensivistas españoles recomiendan a las personas con sobrepeso acudir a su médico de Atención Primaria o a un endocrino para realizar dietas, y "nunca acudir a otros métodos por iniciativa propia o por recomendaciones de fuentes no especializadas", como amigos o familiares. La Semicyuc ha instado a los

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

<http://saludlaboral-fspugtcordoba.blogspot.com.es/2012/07/divulgativos-la-mitad-de-los-ingresados.html>



Tu Seguro de Salud d  
*SegurosdeSalud.co*

Inicio

España

Deportes

Internacional

## La mitad de los ingresados en la UCI por infarto padece sobrepeso



Así lo advierte hoy, en un comunicado, la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (Semicyuc), que ha señalado que el 31,4 por ciento de los enfermos ingresados presenta riesgo coronario por sobrepeso y obesidad.

Estos datos, recogidos en el Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (Ariam), elaborado por esta sociedad, revelan que la obesidad, junto al aumento del colesterol, la hipertensión arterial y al hábito de

Sociedad



# La mitad de los ingresados en la UCI por infarto padece sobrepeso

24 de julio de 2012

Esta página ha sido vista 5 veces. [Entra](#) para que tus amigos sepa

[Recommend](#) [Twitter](#) [Compartir](#)

La mitad de los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por enfermedades coronarias padece sobrepeso y otro 25 por ciento tiene obesidad. Así lo advierte este martes, en un comunicado, la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (Semicyuc), que ha señalado que el 31,4 por ciento de los enfermos ingresados presenta riesgo coronario por sobrepeso y obesidad...

[Leer noticia completa en ABC.es](#)

[Gente QUE!](#) [Connect](#) [Twitter](#) [ANÓNIMO](#)

**Añadir Comentario**

Escriba su comentario.



Suscribirse a Qué.es

[Like](#) [33,865 people like thi](#)

Estás en: El Comercio Digital > Sociedad > Últimas noticias > La mitad de los ingresados en la UCI por infarto padece sobrepeso

ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD 11:23

## La mitad de los ingresados en la UCI por infarto padece sobrepeso

Noticias EFE

Madrid, 23 jul (EFE).- La mitad de los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por enfermedades coronarias padece sobrepeso y otro 25 por ciento tiene obesidad.

Así lo advierte hoy, en un comunicado, la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (Semicyuc), que ha señalado que el 31,4 por ciento de los enfermos ingresados presenta riesgo coronario por sobrepeso y obesidad.

Estos datos, recogidos en el Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (Ariam), elaborado por esta sociedad, revelan que la obesidad, junto al aumento del colesterol, la hipertensión arterial y al hábito de fumar, son los factores más presentes en los pacientes que padecen un infarto agudo de miocardio.

De esta manera, los intensivistas españoles recomiendan a las personas con sobrepeso acudir a su médico de Atención Primaria o a un endocrino para realizar dietas, y "nunca acudir a otros métodos por iniciativa propia o por recomendaciones de fuentes no especializadas", como amigos o familiares.

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

[http://www.elcomercio.es/agencias/20120724/mas-actualidad/sociedad/mitad-ingresados-infarto-padece-sobrepeso\\_201207241123.html](http://www.elcomercio.es/agencias/20120724/mas-actualidad/sociedad/mitad-ingresados-infarto-padece-sobrepeso_201207241123.html)

Búscanos en Facebook

ELCOMERCIO.es El Comercio Digit:  
Me gusta

A 21,622 personas les gusta El Con



Miguel Angel Maria Mayte



# En España, el 75 % de los ingresados en las ucis por infarto tienen sobrepeso u obesidad

La obesidad, el aumento de colesterol, la hipertensión arterial y el tabaco son los factores más presentes en los pacientes

MADRID / EFE

25 de julio de 2012 04:00

★★★★★ 0 votos

La mitad de los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos españolas por enfermedades coronarias padecen sobrepeso y otro 25 % tienen obesidad. Eso supone que el 75 % de todos ellos tienen kilos de más.

Así lo advirtió ayer la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (Semicyuc), que señala que el 31 % de los enfermos ingresados presentan riesgo coronario por sobrepeso y obesidad.

Estos datos, recogidos en el Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (Ariam), elaborado por esta sociedad, revelan que la obesidad, junto al aumento del colesterol, la hipertensión arterial y el tabaco son los factores más presentes

Publicidad

**PESCANOVA**  
Lo bueno sale bien

¿Quieres **10€**  
en vales para descontar  
en Merluza Pescanova?

Lomos Merluza  
Filete Merluza sin piel

Sólo por hacerte socio del Club Online Pescanova

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

[http://www.lavozdegalicia.es/noticia/salud/2012/07/25/espana-75-ingresados-ucis-infarto-sobrepeso-u-obesidad/0003\\_201207G25P36992.htm](http://www.lavozdegalicia.es/noticia/salud/2012/07/25/espana-75-ingresados-ucis-infarto-sobrepeso-u-obesidad/0003_201207G25P36992.htm)

Estás en: [diariovasco.com](#) > [Sociedad](#) > [Últimas noticias](#) > [La mitad de los ingresados en la UCI por infarto padece sobrepeso](#)

ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD 11:23

## La mitad de los ingresados en la UCI por infarto padece sobrepeso

Noticias EFE

Madrid, 23 jul (EFE).- La mitad de los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por enfermedades coronarias padece sobrepeso y otro 25 por ciento tiene obesidad.

Así lo advierte hoy, en un comunicado, la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (Semicyuc), que ha señalado que el 31,4 por ciento de los enfermos ingresados presenta riesgo coronario por sobrepeso y obesidad.

Estos datos, recogidos en el Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (Ariam), elaborado por esta sociedad, revelan que la obesidad, junto al aumento del colesterol, la hipertensión arterial y al hábito de fumar, son los factores más presentes en los pacientes que padecen un infarto agudo de miocardio.

De esta manera, los intensivistas españoles recomiendan a las personas con sobrepeso acudir a su médico de Atención Primaria o a un endocrino para realizar dietas, y "nunca acudir a otros métodos por iniciativa propia o por recomendaciones de fuentes no especializadas", como amigos o familiares.



Este artículo sigue en el siguiente enlace:

[http://www.diariovasco.com/agencias/20120724/mas-actualidad/sociedad/mitad-ingresados-infarto-padece-sobrepeso\\_201207241123.html](http://www.diariovasco.com/agencias/20120724/mas-actualidad/sociedad/mitad-ingresados-infarto-padece-sobrepeso_201207241123.html)

## **La mitad de los ingresados en la UCI por infarto padece sobrepeso**

La mitad de los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por enfermedades coronarias padece sobrepeso y otro 25 por ciento tiene obesidad.

Así lo advierte este martes, en un comunicado, la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (Semicyuc), que ha señalado que el 31,4 por ciento de los enfermos ingresados presenta riesgo coronario por sobrepeso y obesidad.

Estos datos, recogidos en el Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (Ariam), elaborado por esta sociedad, revelan que la obesidad, junto al aumento del colesterol, la hipertensión arterial y al hábito de fumar, son los factores más presentes en los pacientes que padecen un infarto agudo de miocardio.

De esta manera, los intensivistas españoles recomiendan a las personas con sobrepeso acudir a su médico de Atención Primaria o a un endocrino para realizar dietas, y «nunca acudir a otros métodos por iniciativa propia o por recomendaciones de fuentes no especializadas», como amigos o familiares.

La Semicyuc ha instado a los pacientes a seguir una dieta sana y a la práctica del deporte diario, «aunque sea un simple paseo», para eludir el sedentarismo, «el mayor enemigo pasivo de la obesidad».

Fuente: ABC - 24/07/2012 11:47

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

<http://www.exvagos.com/paginas-interiores/346437-mitad-ingresados-uci-infarto-padece-sobrepeso.html>

# iberoamérica.net / españa

Las noticias que se leen ahora en las redes sociales



[Portada](#) > [España](#) > [Prensa generalista](#) > [abc.es](#)

ARCHIVO: [24-7-2012](#)

[IR A LA PORTADA DE HOY](#)

## 49 La mitad de los ingresados en la UCI por infarto padece sobrepeso

<http://www.abc.es/20120724/sociedad/abci-ingresados-ucis-infarto-sobrepeso-201207241139.html>

## La mitad de los ingresados en la UCI por infarto padece sobrepeso



Así lo advierte hoy, en un comunicado, la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (Semicyuc), que ha señalado que el 31,4 por ciento de los enfermos ingresados presenta riesgo coronario por sobrepeso y

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

<http://feeddo.com/n/1487211-la-mitad-de-los-ingresados-en-la-uci-por-infarto-padece-sobrepeso>

## La mitad de los ingresados en la UCI por infarto padece sobrepeso



La mitad de los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por enfermedades coronarias padece sobrepeso y otro 25 por ciento tiene ...

Fonte: ABC.es - hace 7 días



enviar a un amigo



comentar

## La mitad de los ingresados en la UCI por infarto padece sobrepeso

*Noticia original:*

La mitad de los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por enfermedades coronarias padece sobrepeso y otro 25 por ciento tiene obesidad.

Así lo advierte este martes, en un comunicado, la **Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (Semicyuc)**, que ha señalado que el 31,4 por ciento de los enfermos ingresados presenta riesgo coronario por sobrepeso y obesidad.

Estos datos, recogidos en el Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (Ariam), elaborado por esta sociedad, revelan que la obesidad, junto al aumento del colesterol, la hipertensión arterial y al hábito de fumar, son los factores más presentes en los pacientes que padecen un infarto agudo de miocardio.



Este artículo sigue en el siguiente enlace:

<http://actualidadraruna.blogspot.com.es/2012/07/la-mitad-de-los-ingresados-en-la-uci.html>

ENLACE DE INTERÉS

## En España, el 75 % de los ingresados en las ucis por infarto tienen sobrepeso u obesidad

25/07/2012 00:15 | madrid / efe |  Leer artículo completo en La Voz de Galicia

La **obesidad**, el aumento de colesterol, la hipertensión arterial y el tabaco son los factores más presentes en los **pacientes**.

## **SEMICYUC advierte que un número elevado de pacientes que ingresan en la UCI tiene sobrepeso**

Madrid (27/07/2012) - Redacción

**Estos datos se ponen de manifiesto en el último corte del único registro continuo sobre infartos que existe en España, el Registro de Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (ARIAM), elaborado por la Sociedad Española de Medicina Intensiva**

La Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SEMICYUC) advierte que un número elevado de pacientes que ingresan en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de nuestro país tiene sobrepeso. Además, los intensivistas españoles advierten que es un factor de riesgo importante para los enfermos de corazón con enfermedades coronarias ingresados y registrados por SEMICYUC. Estos datos se ponen de manifiesto en el último corte del único registro continuo sobre infartos que existe en España, el Registro de Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio, ARIAM, que es elaborado por la Sociedad Española de Medicina Intensiva.

Este artículo sigue en el siguiente enlace:

<http://saludequitativa.blogspot.com.es/2012/07/semicyuc-advierte-que-un-numero-elevado.html>

## En España, el 75 % de los ingresados en las ucis por infarto ... – La Voz de Galicia

**En España, el 75 % de los ingresados en las ucis por infarto ...**

La Voz de Galicia



La Razón

La mitad de los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos españolas por enfermedades coronarias padecen sobrepeso y otro 25 % tienen obesidad. Eso supone que el 75 % de todos ellos tienen kilos de más. Así lo advirtió ayer la Sociedad ...

**La mitad de los ingresados en la UCI por infarto padece sobrepeso**[ABC.es](http://ABC.es)

## SEMICYUC advierte que un número elevado de pacientes que ingresan en la UCI tiene sobrepeso

- Enviar Noticia
- Imprimir
- Vota
- Comentar
- Compartir



Madrid (27/07/2012) - Redacción

**Estos datos se ponen de manifiesto en el último corte del único registro continuo sobre infartos que existe en España, el Registro de Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio (ARIAM), elaborado por la Sociedad Española de Medicina Intensiva**

La Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SEMICYUC) advierte que un número elevado de pacientes que ingresan en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de nuestro país tiene sobrepeso. Además, los intensivistas españoles advierten que es un factor de riesgo importante para los enfermos de corazón con enfermedades coronarias ingresados y registrados por SEMICYUC. Estos datos se ponen de manifiesto en el último corte del único registro continuo sobre infartos que existe en España, el Registro de Análisis del Retraso en el Infarto Agudo de Miocardio, A **101%** se elabora por la Sociedad Española de Medicina Intensiva.

De los datos se extrae el riesgo que supone no cuidar los hábitos alimenticios, y convierte a la obesidad junto con el aumento del colesterol, la hipertensión arterial y el hábito de fumar en los factores más presentes en aquellos pacientes que padecen un infarto agudo de miocardio.

Los intensivistas españoles recomiendan a las personas con sobrepeso acudir a su médico de familia o a un especialista en Endocrinología y nunca realizar dietas u otros métodos por iniciativa propia o recomendaciones de amigos, familiares y fuentes no especializadas.

De igual forma, SEMICYUC insta a seguir una dieta sana y equilibrada y a la práctica del deporte diario para eludir el mayor enemigo pasivo de la obesidad: el sedentarismo.

Por último, los intensivistas subrayan también que cada vez advierten con mayor frecuencia el ingreso de pacientes con infarto agudo de miocardio de consumidores habituales de sustancias tóxicas como la cocaína.